



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Analizę wykonano zgodnie z danymi aktualnymi na dzień 8 stycznia 2023r.

Aktualna sytuacja w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie w roku kalendarzowym 2023 oraz w sezonie 2022/2023 (licząc od 1 września 2022 r.)

Ogniska HPAI u drobiu w ostatnich 7 dniach:

- 3.01. wielkopolskie, powiat pleszewski (indyki rzeźne)
- 3.01. pomorskie, powiat człuchowski (drób przyzagrodowy, różne gatunki)
- 3.01. pomorskie, powiat człuchowski (drób przyzagrodowy, kaczki)
- 5.01. wielkopolskie, powiat kaliski (indyki rzeźne)
- 6.01. wielkopolskie, powiat kaliski (kaczki rzeźne)
- 6.01. kujawsko-pomorskie, powiat grudziądzki (indyki rzeźne)
- 8.01. wielkopolskie, powiat ostrowski (indyki rzeźne)
- 8.01. wielkopolskie, powiat ostrzeszowski (kaczki rzeźne)

Podsumowanie sytuacji w Polsce

Wszystkie szczepy wirusa HPAI wykryte w sezonie 2022/2023 należą do podtypu H5N1.


Województwo	Powiat	Liczba ognisk u drobiu w 2023 r.	Liczba ognisk u drobiu w sezonie 2022/2023	Liczba ognisk u dzikich ptaków w 2023 r.	Liczba ognisk u dzikich ptaków w sezonie 2022/2023
dolnośląskie	średzki	-	-	-	1
	wołowski	-	1	-	-
	lipnowski	-	1	-	1
	świecki	-	-	-	3
	wrocławski	-	-	-	1
kujawsko-pomorskie	grudziądzki	1	1	-	-
	żniński	-	-	1	1
lubuskie	wschowski	-	-	-	1
lubelskie	łęczyński	-	1	-	-
łódzkie	łaski	-	4	-	-
	łęczycki	-	1	-	-
	łódzki wschodni	-	1	-	-
	poddębicki	-	1	-	-
	sieradzki	-	2	-	-
	tomaszowski	-	1	-	-
	zduńskowolski	-	2	-	-
mazowieckie	gostyński	-	1	-	-
	łosicki	-	1	-	-
	warszawski	-	-	-	1
opolskie	namysłowski	-	3	-	2
	nyski	-	-	2	2
pomorskie	czyłuchowski	2	4	-	-
	wejherowski	-	-	-	1
	zawierciański	-	1	-	-
warmińsko-mazurskie	elbląski	-	-	-	1
	iławski	-	1	-	-

	piski	-	1	-	-
wielkopolskie	kaliski	2	3	-	-
	ostrowski	1	1		
	ostrzeszowski	1	6	-	-
	pleszewski	1	2	-	-
	szamotulski	-	1	-	
	turecki	-	1	-	-
Razem		8	42	3	15

Ponadto w dniu 7.12.2022 r. wykryto 1 ognisko u ptaków dzikich utrzymywanych w niewoli (2 bociany i 2 żurawie) w powiecie słupskim.

Szczegółowe informacje nt. liczby ptaków w ogniskach dostępne na stronie <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai>

Ryc. 1. Lokalizacja ognisk HPAI w Polsce w sezonie 2022/2023




Sytuacja w Europie w sezonie 2022/2023

Liczba państw w których wystąpiła HPAI: 30

Liczba ognisk u dzikich ptaków: 647

Liczba ognisk u drobiu i ptaków utrzymywanych w niewoli: 709


Ryc. 2. Lokalizacja ognisk w Europie w sezonie 2022/2023 na podstawie danych EURL w Padwie (interaktywna mapa dostępna na stronie <https://eurlaidata.izsvenezie.it/map.php>, nie uwzględnia Wielkiej Brytanii); punkty czerwone – drób fermowy, punkty fioletowe – drób przyzagrodowy, punkty szare – dzikie ptaki, punkty różowe – dzikie ptaki utrzymywane w niewoli).



Opracowanie: dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać pasze w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe; drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności