



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE
ODDZIAŁ W BISKUPCU**

PIORIN

ul.niepodległości 4 A, 11-300 Biskupiec
tel./fax (89)7152391,698612432
wi- olsztyn@piorin.gov.pl., e-mail: o-biskupiec@piorin.gov.pl

OBI.7122.3.2.2016

Biskupiec, 15.04.2016 r.

Szanowni Państwo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Oddział w Biskupcu informuje, że w dniu 05.04.2016 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem: www.piorin.gov.pl/olsztyn (klikając na zakładkę sygnalizacja), zostały uruchomione komunikaty sygnalizujące sposób i termin zwalczania chorób i szkodników w rzepaku ozimym. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydrukowanie go w kolorze (w celu indentyfikacji agrofaga) i umieszczeniu na tablicy informacyjnej w siedzibie instytucji:

rzepak ozimy – ślodysek rzepakowy, sucha zgnilizna kapustnych.

Kierownik Oddziału
Joanna Kurgan

Otrzymują:

Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Urząd Miasta i Gminy Biskupiec
Urząd Miasta i Gminy Dobre Miasto
Urząd Miasta i Gminy Jeziorany
Urząd Miasta i Gminy Olsztynek
Urząd Gminy Dywity
Urząd Gminy Gietrzwałd
Urząd Gminy Jonkowo
Urząd Gminy Kolno
Urząd Gminy Purda
Urząd Gminy Świątki
Urząd Gminy Stawiguda
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie

Sprawę prowadzi : St.Inspektor Jerzy Rossa

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów



Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn

Roślina: Rzepak ozimy

Agrofag: Słodyszek rzepakowy



Data rozpoczęcia zabiegów: 2016-04-15

Szczegóły:

Na plantacjach rzepaku ozimego pojawiły się chrząszcze słodyszka rzepakowego. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.

Zalecenia:

Chrząszcze na pola rzepaku przelatują najczęściej w okresie przed kwitnieniem, gdy temperatura powietrza osiągnie wartość powyżej 15°C. Szkody na plantacjach rzepaku powodują głównie chrząszcze wgryzające się do pąków kwiatowych, wydrążając ich część, aby dostać się do pyłku kwiatowego. Uszkodzone pąki żółkną, usychają a następnie opadają, pozostają jedynie szypułki kwiatowe.

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj. stwierdzenia:

1-2 chrząszczy na 1 roślinie w stadium zwartego kwiatostanu
lub
3-5 chrząszczy na 1 roślinie w stadium luźnego kwiatostanu

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:
prawidłowej agrotechniki
izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych
wysiew odmian wcześniej zakwitających
wysiew odmian wcześniej wznawiających wegetację wiosenną

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- 1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj,
- 2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj.

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:
<http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin>

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów



Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn

Roślina: Rzepak ozimy

Agrofag: Sucha zgnilizna kapustnych



Data rozpoczęcia zabiegów: 2016-04-14

Szczegóły:

Plantacjom rzepaku ozimego zagraża sucha zgnilizna kapustnych.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania suchej zgnilizny kapustnych na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.

Zalecenia:

Rozwojowi choroby na plantacjach rzepaku ozimego sprzyja deszczowa pogoda i temperatura powyżej 15°C oraz uszkodzenia przez szkodniki. Źródłem infekcji są resztki poźniwne i porażony materiał siewny. Choroba pojawia się w okresie jesieni i rozwija się przez cały okres wegetacji rzepaku, jest szczególnie groźna gdy wystąpi na łodydze. Objawy można obserwować także na liścieniach, liściach, szyjkach korzeniowych i łuszczynach.

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy.

Progiem ekonomicznej szkodliwości jest stwierdzenie 10-15% roślin rzepaku ozimego z objawami suchej zgnilizny kapustnych postaci zbrunatnienia szyjek korzeniowych lub żółto-brunatnych plam z piknidiami na liściach.

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

stosowanie prawidłowej agrotechniki: w tym zachowanie 4-5 letniej przerwy w uprawie roślin krzyżowych na tym, samym polu

używanie do siewu zdrowych nasion, które powinny być zaprawione

stosowanie izolacji przestrzennej od ubiegłorocznych plantacji roślin na których występowała choroba

zwalczanie szkodników

zwalczanie chwastów (szczególnie z rodziny krzyżowych)

stosowanie rzadkiego siewu

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- 1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - [kliknij tutaj](#),
- 2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - [kliknij tutaj](#).