



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA W OLSZTYNIE
ODDZIAŁ W BISKUPCU**

Osip. 6182. NO. 2017.JM.

ul. Niepodległości 4 A, 11-300 Biskupiec
tel./fax (89) 715 23 91
www.piorin.gov.pl/olsztyn , e-mail: o-biskupiec@piorin.gov.pl

OBI.7122.3.13.2017

Biskupiec, 21.06.2017 r.

Szanowni Państwo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Oddział w Biskupcu informuje, że w dniu 21.06.2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem: www.piorin.gov.pl/olsztyn (klikając na zakładkę sygnalizacja), został uruchomiony komunikat sygnalizujący sposób i termin zwalczania chorób grzybowych kłosów pszenicy zwyczajnej ozimej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydrukowanie go w kolorze (w celu identyfikacji agrofaga) i umieszczeniu na tablicy informacyjnej w siedzibie instytucji:

pszenica zwyczajna ozima – septorioza plew pszenicy

Otrzymują:

Urząd Miasta i Gminy Barczewo
Urząd Miasta i Gminy Biskupiec
Urząd Miasta i Gminy Dobre Miasto
Urząd Miasta i Gminy Jeziorany
Urząd Miasta i Gminy Olsztynek
Urząd Gminy Dywity
Urząd Gminy Gietrzwałd
Urząd Gminy Jonkowo
Urząd Gminy Kolno
Urząd Gminy Purda
Urząd Gminy Świątki
Urząd Gminy Stawiguda
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie

Sprawę prowadzi: St. Inspektor Jerzy Rossa

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów



Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn

Roślina: Pszenica ozima

Agrofag: Septorioza plew pszenicy



Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-06-21

Szczegóły:

Plantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza plew pszenicy.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania septoriozy plew pszenicy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zalecenia:

Pierwsze objawy choroby można obserwować już na siewkach jesienią. Wiosną porażane są najpierw dolne liście roślin. Następnie patogen przenosi się na górne liście, dokłosisie i kłos, poraża ziarniaki. Choroba występuje w większym nasileniu po łagodnej zimie i wilgotnych latach o zwiększonej ilości opadów. Warunkiem wystąpienia silnego zakażenia jest utrzymanie się zwilżenia liści przez okres 3-6 godzin przy temperaturze 20-24 oC. W korzystnych warunkach okres inkubacji (wylegania się) choroby wynosi 7-14 dni.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko porażenia są:

zainfekowane ziarno

deszczowa pogoda wczesnym latem (od początku kłoszenia do końca kwitnienia)

obecność zainfekowanych resztek poźniwnych

uprawa odmian o niskiej słomie

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie.

Po stwierdzeniu objawów chorobę zwalcza się:

w fazie krzewienia, gdy występuje silne porażenie liści

pod koniec strzelania w źdźbło lub na początku kłoszenia, jeżeli objawy porażenia wystąpiły na górnych liściach (5-10% liści z plamami) i utrzymuje się duża wilgotność.

Przy braku porażenia górnych liści, zabieg wykonuje się wtedy, gdy na kłosach występują pierwsze objawy choroby. Zabiegi można maksymalnie wykonywać do fazy dojrzałości mleczonej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- 1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj,
- 2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj.

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: <http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin>

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

- 1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
- 2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
- 3) Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
- 4) Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
- 5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata

Drukuj