


UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.

Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem.

Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.


Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.


Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




1 Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!



2 Nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione!




3 Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




4 Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).



5 Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




6 Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.




7 Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.




8 Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.



9 Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



10 Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja.



11 Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.



12 Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skróty szyi, drgawki, biegunka, duszność). Nie zwlekaj - zawiadom