

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

African Swine Fever (ASF)

CO TO JEST?

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Wirus jest odporny na wysoką temperaturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do 3 lat w mrożonym mięsie.

Zainfekowane zwierzęta są trwale zakażone, a wirus obecny jest we wszystkich płynach ustrojowych, wydalinach i wydzielinach. Bardzo szybki przebieg choroby sprawia, że zwierzęta padają w dobrej kondycji.

W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie



przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

DROGI ZAKAŻENIA

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi.

Wirus Afrykańskiego pomoru świń rozprzestrzenia się:

- za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo,
- skażonego sprzętu i narzędzi,



- zwierząt dzikożyjących – dzików,
- zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy),
- skażoną paszę,
- skażoną wodę,
- skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

PAMIĘTAJ!

- nie dotykaj padłych zwierząt,
- nie pozwól domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
- w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem jak najszybciej umyj ręce lub zdezynfekuj środkiem na bazie alkoholu,
- nie wyrzucaj żywności i odpadów kuchennych w miejsca potencjalnie dostępne dla dzików,
- osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych,
- przestrzegaj zaleceń służb weterynaryjnych na swoim terenie.

Gdy znajdziesz padłe zwierzę, powiadom najbliższego powiatowego lekarza weterynarii lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Opracowanie: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie na podstawie komunikatu GIS w sprawie wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń oraz informacji przygotowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

